



بررسی آسیب به شبکیه چشم متعاقب مصرف سیکلوسپورین A

سمانه غلامی^۱، عقیل تبار ملاحسن^{۲*}، محمد مسعود شوشتیریان^۳

۱- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل - دانشکده علوم پایه- گروه زیست‌شناسی- کارشناس ارشد.

۲- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل - دانشکده علوم پایه- گروه ایمونولوژی- دکترای تخصصی.

۳- دانشگاه علوم پزشکی بابل- متخصص چشم پزشکی- دکترای حرفه‌ای.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۵/۱۴، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۷/۱۲

چکیده

مقدمه: داروی سیکلوسپورین A بعنوان یک داروی مهارکننده سیستم ایمنی در بسیاری از بیماری‌ها تجویز می‌گردد. از جمله عوارض ناشی از مصرف سیکلوسپورین، اختلالات بینایی و آسیب به شبکیه است. روش‌های متفاوتی جهت بررسی آسیب به شبکیه موجود است که از بهترین آنها تکنیک الکترورتینوگرام است. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرات مصرف سیکلوسپورین بر شبکیه بیماران مبتلا به آرتربیت روماتوئید بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه مشاهدایی که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شد ۵۵ بیمار مصرف‌کننده سیکلوسپورین به‌علت آرتربیت روماتوئید در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۵ به صورت در دسترس انتخاب شده و تحت آزمون الکترورتینوگرافی قرار گرفتند و ولتاژ و فاز تأخیری در آنها تعیین و با گروه طبیعی مقایسه شد. نتایج براساس میانگین، گزارش و با استفاده از آزمون تجزیه و تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل شد. سطح معنی داری نیز 0.05 در نظر گرفته شد.

نتایج: میانگین ولتاژ ثبت شده در ERG برابر با 74.7 با انحراف معیار 29.7 بود که اختلاف آماری معناداری را با مقدار طبیعی یعنی 125 نشان می‌داد ($P=0.000$). میانگین فاز تأخیری ثبت شده نیز 33.9 با انحراف معیار 35.1 بود که اختلاف آماری معناداری را با مقدار طبیعی یعنی 32.9 نمی‌داد ($P=0.545$).

نتیجه‌گیری: براساس نتایج حاصل از این مطالعه چنین استنباط می‌شود که مصرف سیکلوسپورین سبب کاهش معناداری در ولتاژ ثبت شده در الکترورتینوگرام می‌شود اما بر روی فاز تأخیری مؤثر نمی‌باشد. لذا بیماران مصرف‌کننده این دارو باید تحت نظر چشم پزشک روند درمانی خود را ادامه دهند.

واژه‌های کلیدی: الکترورتینوگرافی، سیکلوسپورین، شبکیه.

*نویسنده مسئول: بابل- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل- دانشکده علوم پایه- گروه ایمونولوژی، تلفن: ۰۱۱-۳۲۲۹۶۳۴، نمبر: ۰۱۱-۳۲۲۹۶۳۴.

Email: doctoragheel@yahoo.com

ارجاع: غلامی سمانه، تبار ملاحسن عقیل، شوشتیریان محمد مسعود. بررسی آسیب به شبکیه چشم متعاقب مصرف سیکلوسپورین A. مجله دانش و تدرستی ۱۳۹۶؛ ۱۲(۳): ۴۳-۴۷.

مقدمه

سیکلوسپورین A از جمله داروهای سرکوب‌کننده ایمنی است که از تولید و آزاد شدن اینترلوکین ۲ جلوگیری می‌کند و در نتیجه باعث مهار ایمنی سلولی و همورال می‌شود و در درمان بسیاری از بیماری‌های خود ایمنی، بیماری‌های التهابی، بیماری‌های سیستمیک و بیماری‌های جلدی به کار می‌رود (۱ و ۲). به علاوه این دارو برای درمان بسیاری از بیماری‌های چشمی نیز کارآبی به صورت موضعی دارد (۳).

این دارو یک فراورده طبیعی و ماکرولید قارچی است که در جلوگیری از رد پیوند استفاده فراوان دارد. مانند همه داروها عوارض جانبی برای مصرف کنندگان این دارو به شمرده‌اند که شامل: افزایش فشار خون، افزایش رشد موی زائد، سردرد و حالت تهوع است. از دیگر عوارض می‌توان به افزایش احتمال ابتلا به عفونت، مشکلات کبدی و حتی لنفوما اشاره نمود. در دوران بارداری مصرف آن ممکن است به زایمان زودرس منجر گردد (۱).

مکانیزم اثر احتمالی که برای این دارو پیشنهاد شده است کاهش عملکرد لنفوسيتها از طریق ایجاد کمپلکس با سیکلوفیلین است که منجر به مهار فسفاتازی ناشی از کلسینورین شده که در نهایت با کاهش تولید سیتوکین‌های التهابی لنفوسيتی همراه است.

اما نکته مهم در مورد داروی سیکلوسپورین عوارض درمانی ناشی از آن است که می‌تواند با اثر بروی عروق و سایر ساختارهای موجود در ارگان‌های مختلف و بهویژه در چشم سبب مشکلات مختلفی در بیماران مصرف کننده گردد (۴). از طرفی از آنجا که این دارو بر میزان کلیسیم درون سلول مؤثر است لذا ممکن است از طریق تداخل در پیامرانی بینایی در شبکیه و اختلال در پتانسیل عمل نورون‌های شبکیه اختلالات بینایی را باعث شود. لذا مونیتورینگ از نظر عوارض جانبی و نیز انجام معاینات دوره‌ای می‌تواند در تشخیص عوارض جانبی ناشی از مصرف این دارو بهویژه در ارگان‌های حساس مانند چشم و سیستم عصبی کمک کننده باشد (۵).

بررسی و تعیین آسیب اولیه به شبکیه و اعصاب چشمی از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که معمولاً این عوارض برگشت‌ناپذیر خواهند بود. هر چند از روش‌های تشخیصی مختلفی شامل معاینه، بررسی با کمک دستگاه‌های رایانه‌ای و بسیاری از روش‌های دیگر برای تشخیص عوارض چشمی در افراد تحت درمان با سیکلوسپورین استفاده می‌شود؛ اما به کار بردن روش‌هایی که دقت تشخیصی بالاتری داشته باشند، امکان تشخیص سریع‌تر این اختلالات و جلوگیری از پیشرفت آنها را با انجام درمان‌های مناسب فراهم می‌نماید. یکی از مهمترین این روش‌ها و آزمون‌های الکتروفیزیولوژیک، تکنیک الکتروریتوگرام (ERG) است که اجزا ارزیابی Objective راه عصب بینایی را در افراد می‌دهد. در این تکنیک فعالیت الکتریکی یا پتانسیل


الکتریکی حاصل از شبکیه با تحریک نوری آن حاصل می‌گردد. الکتروریتوگرام تمامیت (Integrity) (ایله رتین) را اندازه می‌گیرد. به عبارتی ERG که از شبکیه بعد از تحریک نمودن آن به دست می‌آید، یکی از روش‌های الکتروفیزیولوژیک تشخیص اختلالات عملکردی شبکیه است. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در این مطالعه به بررسی اثر سیکلوسپورین A بر روی شبکیه چشم به وسیله تکنیک الکتروریتوگرام پرداختیم.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه که به صورت مقطعی و آینده‌نگر انجام شد تعداد ۵۵ بیمار مبتلا به آرتربیت روماتوئید تحت بررسی قرار گرفتند. همین‌طور تعداد ۵۵ فرد سالم نیز به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. بیماران از هر دو جنس مبتلا به آرتربیت روماتوئید بودند و سابقه مصرف سیکلوسپورین را حداقل به مدت ۶ ماه پیوسته داشتند که در زمان مطالعه هنوز دارو مصرف می‌کردند.

پس از اخذ رضایت آگاهانه و انجام مصاحبه اولیه و ثبت اطلاعات در پرسشنامه‌های مخصوص بیماران جهت معاینه و انجام تست معاینات چشمی و الکتروریتوگرام به متخصص چشم ارجاع شدند. بیمارانی که در طول مطالعه مصرف دارو را قطع نموده و یا با اختیار خود از مطالعه حذف گردیدند. افراد با هرگونه سابقه ترومما در سر و صورت نیز از مطالعه حذف شدند تا در نتایج و تفسیر آن تداخلی ایجاد نگردد. در مورد انجام آزمون ریتوگرام برای هر بیمار توضیحات لازم ارایه گردید. الکتروریتوگرام با فلاش زنون و با استفاده از دستگاه Roland Consult RET-Port21 در بیمارستان چشم پزشکی نور تهران انجام شد. قبل از انجام آزمون، با استفاده از قطره تروپیکا ۱٪ مردمک چشم باز شد و EEG Gold Cup سپس الکترودگذاری با استفاده از الکترودهای تماسی به عنوان الکترودهای زمین و مرجع و الکترودهای تماسی به عنوان الکترودهای فعال انجام شد. محرك‌های نورانی توسط فلاش زنون و با فرکانس ۴/۲۹ هرتز به بیماران ارایه می‌شد و دستگاه پس از فیلتر کردن پاسخ‌ها و میانگین‌گیری، سیگنال برآیند را نشان می‌داد. شدت نوری محرك برابر $10\text{cd}/\text{m}^2$ و زمان ترمیم سیگنال ERG برابر 150ms بود.

با اعمال یک فیلتر مسدود‌کننده باند، فرکانس‌های ۴۹ تا ۵۱ هرتز و نویز احتمالی ناشی از برق شهری حذف شد. پس از ثبت، سیگنال‌های ERG ابتدا در حوزه زمان از نظر شاخص‌های دامنه و زمان تأخیر اجزای اصلی تجزیه و تحلیل و بررسی شدند. در پایان داده‌های به دست آمده توسط آزمون آماری T-test و کای دو تجزیه و تحلیل آماری شدند. این مطالعه با کد اخلاق ۲۶-ST1394-BAZU در دانشگاه آزاد واحد بابل ثبت شد.



نمودار ۱- مقایسه اختلاف فاز تأخیری در دو گروه مورد مطالعه نتایج نشان می‌دهد اختلاف معنی‌داری بین دو گروه در فاز تأخیری مشاهده نمی‌شود.

بحث

هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی تغییرات ERG در بیماران مبتلا به آرتربیت روماتوئید مصرف کننده سیکلوسپورین آ بود. همان‌گونه که انتظار می‌رفت کاهش معنی‌دار میانگین ولتاژ مشاهده شد که نشان‌دهنده آسیب اولیه به شبکیه است.

از آنجا که اختلال در هموستاز سلولی کلیسیم و تغییرات سلولی آن در مکانیسم اثر سیکلوسپورین بر Shermande شده است لذا انتظار می‌رود این دارو با تغییرات میزان کلیسین درون نورون شبکیه در ایجاد سگناال بینیانی و پتانسیل عمل ناشی از آن تداخل نموده و لذا تغییرات ولتاژ را باعث شود.

در مطالعه‌ای مداخله‌ای که سروانتس و همکاران در ایالات متحده انجام دادند و نتایج آن در سال ۲۰۱۳ منتشر شد، با بررسی ۹۸ چشم در افراد تحت درمان با سیکلوسپورین با بررسی یک ساله اعلام گردید که این دارو با تغییر چندانی در ولتاژ و فاز تأخیری ثبت شده در ERG همراه نبوده است (۱۴) که با یافته‌های به دست آمده در مطالعه ما در مورد ولتاژ همخوانی ندارد.

در مطالعه کیم و همکاران در آمریکا در سال ۲۰۰۵ با بررسی بر روی نمونه‌های حیوانی شامل سگ و خرگوش مشاهده گردید که تغییر چندانی در یافته‌های الکترورتینوگرام وجود ندارد (۱۵) که مشابه نتایج حاصل از مطالعه ما در مورد فاز تأخیری می‌باشد. در مطالعه‌ای مداخله‌ای که گیلگر و همکاران در ایالات متحده انجام دادند و نتایج آن در سال ۲۰۰۰ منتشر شد، با بررسی نمونه‌های حیوانی (اسب) اعلام گردید که تفاوتی بین ولتاژ چشم در معرض سیکلوسپورین و چشمی که در مواجهه با سیکلوسپورین قرار نگرفته بود، وجود نداشت (۱۶) که همراستا با نتایج مطالعه ما نمی‌باشد.

در مطالعه‌ای موردى که لوپز و همکاران در اسپانیا انجام دادند و نتایج آن در سال ۱۹۹۷ منتشر شد، با بررسی یک بیمار تحت پیوند مغز استخوان در فاز ۲۲ ماه پس از پیوند، اعلام گردید که در

نتایج

پس از تجزیه و تحلیل سیگنال Falsh Xenon ERG در حوزه زمان نتایجی بدست آمد که در ادامه به توضیح آنها پرداخته می‌شود. در مطالعه حاضر تعداد ۵۵ بیمار مبتلا به آرتربیت روماتوئید مصرف کننده سیکلوسپورین A و ۵۵ فرد سالم مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد ۴۰ بیمار (۷۲/۷٪) مؤنث و تعداد ۱۵ بیمار (۲۷/۳٪) مذکور بودند. میانگین سنی بیماران ۴۵/۸±۱۲/۴ سال بود. همچنین افراد از نظر بیماری زمینه‌ای و مصرف دخانیات بررسی شدند (جدول ۱).

نتایج مطالعه حاضر کاهش معنی‌دار میانگین ولتاژ را در بیماران مورد مطالعه در مقایسه با مقادیر طبیعی نشان داد (جدول ۲). میانگین ولتاژ ثبت شده در ۷۴/۷ ERG با انحراف معیار ۳۲/۳۹ نشان معناداری را با مقدار طبیعی یعنی ۱۲۵ نشان می‌داد ($P=0/0001$). از طرفی میانگین فاز تأخیری ثبت شده ۳۳/۹ با انحراف معیار ۳/۵۸ بود که اختلاف آماری معناداری را با مقدار طبیعی یعنی ۳۲/۳۹ نشان نمی‌داد ($P=0/545$) (جدول ۳ و نمودار ۱). همچنین نتایج نشان داد بین میانگین ولتاژ و جنس ارتباط معنی‌داری وجود ندارد ($P>0/85$).

جدول ۱- توزیع فراوانی متغیرهای کیفی و بیان میانگین و انحراف معیار متغیر کمی مطالعه در گروه بیمار مبتلا به آرتربیت روماتوئید

	مجموع (%)	مؤنث (%)	مذکور (%)
(۱۰۰) ۵۵	(۷۲/۷) ۴۰	(۲۷/۳) ۱۵	جنس
۴۵/۸±۱۲/۴	۴۲/۰±۸/۵	۴۸/۳±۹/۶	سن (سال)
(۲۹) ۱۶	(۲۵/۰) ۱۰	(۴۰) ۶	دیابت
(۳۱) ۱۷	(۳۵/۰) ۱۴	(۲۰) ۳	پرفشاری خون
(۲۱/۸) ۱۲	(۷/۵) ۳	(۶۰) ۹	استعمال دخانیات

جدول ۲ میانگین ولتاژ ثبت شده در ۷۴/۷ ERG با انحراف معیار ۳۲/۳۹ بود که اختلاف آماری معناداری را با مقدار طبیعی یعنی ۱۲۵ نشان می‌داد ($P=0/0001$).

جدول ۲- توزیع فراوانی ولتاژ ثبت شده در ERG

P.V	گروه مورد مطالعه	انحراف معیار	میانگین	گروه بیماران
.۰/۰۰۱	۷۴/۷	۲۹/۷	۱۱	۱۲۵
	گروه افراد سالم			

جدول ۳- توزیع فراوانی فاز تأخیری ثبت شده در ERG

P.V	گروه مورد مطالعه	انحراف معیار	میانگین	گروه بیماران
.۰/۵۴۵	۳/۵۸	۳۳/۹	۳۵/۰	۳۲/۳۹
	گروه افراد سالم			

جدول ۳ میانگین فاز تأخیری ثبت شده ۳۲/۷ با انحراف معیار ۵/۸ بود که اختلاف آماری معناداری را با مقدار طبیعی یعنی ۳۲ نشان نمی‌داد ($P=0/545$).

6. Dyck PJ, Chance P, editors. Hereditary motor and sensory neuropathies. In: Dyck PJ, Thomas PK, editors. Peripheral neuropathy. 3rd ed. Philadelphia, Pa: WB Saunders;1993:1094-136.
7. Fauci AS, Braunwald E, editors. Harrison's principles of internal medicine. 17th ed. McGraw-Hill;2008.
8. John Hall Arthur Guyton, editors. Textbook of medical physiology. 9th ed. Guyton and Hall;2000.
9. Text Book of General ophthalmology. 15th ed. Appleton and Lange;1999.
10. Shoushtarian SMM. A survey of frequency and latency of ERG. J Azad University of Tehran 2006;18:21-7.
11. Halliday A. Evoked potential in clinical testing. 1st ed. Churchill Livingstone. New York;1993.
12. Whittakar S, Seigfried J. Origin of wavelets in the visual evoked potential. *Electroencephalogr Clin Neurophysiol* 1983;55:91-101.
13. Bajalar AA, Wright CE, Vander Viliet VJ. Changes in the human VEP caused by the anticholinergic agent, hyosine hydrobromide. *J Neural Neurosurgery Psychiatry* 1986;49:175-82. doi: 10.1136/jnnp.49.2.175
14. Cervantes-Castañeda RA, Gonzalez-Gonzalez LA, Cordero-Coma M, Yilmaz T, Foster CS. Combined therapy of cyclosporine A and mycophenolate mofetil for the treatment of birdshot retinochoroidopathy: a 12-month follow-up. *Br J Ophthalmol* 2013;97:637-43. doi: 10.1136/bjophthalmol-2012-302123
15. Kim H, Csaky KG, Gilger BC, Dunn JP, Lee SS, Tremblay M, et al. Preclinical evaluation of a novel episcleral cyclosporine implant for ocular graft-versus-host disease. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2005;46:655-62. doi: 10.1167/iovs.04-1076
16. Gilger BC, Malok E, Stewart T, Ashton P, Smith T, Jaffe GJ, et al. Long-term effect on the equine eye of an intravitreal device used for sustained release of cyclosporine A. *Vet Ophthalmol* 2000;3:105-10.
17. López-Jiménez J, Sánchez A, Fernández CS, Gutiérrez C, Herrera P, Odrizola J. Cyclosporine-induced retinal toxic blindness. *Bone Marrow Transplant* 1997;20:243-5. doi: 10.1038/sj.bmt.1700878
18. Enyedi LB, Pearson PA, Ashton P, Jaffe GJ. An intravitreal device providing sustained release of cyclosporine and dexamethasone. *Curr Eye Res* 1996;15:549-57.

الكترورتينوگرام فرد کاهش آمپلیتود وجود داشت (۱۷) که با یافته‌های تحقیق ما همخوانی دارد. در مطالعه‌ای مداخله‌ای که ایندی و همکاران در ایالات متحده انجام دادند و نتایج آن در سال ۱۹۹۶ منتشر شد، با بررسی نمونه‌های حیوانی اعلام گردید که سیکلوسپورین ERG سبب تغییرات برگشت‌پذیری در ولتاژ و فاز تأخیری ثبت شده در می‌شود (۱۸) که تغییرات در ولتاژ مشابه تحقیق ما باشد. در مجموع براساس نتایج حاصل از این مطالعه و مقایسه آنها با سایر مطالعات انجام شده چنین استبطاً می‌شود که مصرف سیکلوسپورین سبب کاهش معناداری در ولتاژ ثبت شده در الکترورتینوگرام می‌شود؛ اما بر روی فا تأخیری مؤثر نمی‌باشد. البته در انتهای توصیه می‌شود باز هم مطالعات بیشتری به منظور تأیید یافته‌های بهدست آمده در این مطالعه، به صورت چند مرکزی و با حجم نمونه بالاتر انجام شوند.

References

1. Germano V, Picchianti Diamanti A, Ferlito C, Podestà E, Salemi S, Migliore A, et al. Cyclosporine A in the long-term management of systemic lupus erythematosus. *J Biol Regul Homeost Agents* 2011;25:397-403.
2. Gupta AK, Ellis CN, Nickoloff BJ, Goldfarb MT, Ho VC, Rocher LL, et al. Oral cyclosporine in the treatment of inflammatory and noninflammatory dermatoses. A clinical and immunopathologic analysis. *Arch Dermatol* 1990;126:339-50.
3. Rao SN. Topical cyclosporine 0.05% for the prevention of dry eye disease progression. *J Ocul Pharmacol Ther* 2010;26:157-64. doi: 10.1089/jop.2009.0091
4. Iurlaro M, Vacca A, Minischetti M, Ribatti D, Pellegrino A, Sardanelli A, et al. Antiangiogenesis by cyclosporine. *Exp Hematol* 1998;26:1215-22.
5. Hatton J, Rosbott B, Empey P, Kryscio R, Young B. Dosing and safety of cyclosporine in patients with severe brain injury. *J Neurosurg* 2008;109:699-707. doi: 10.3171/JNS/2008/10/0699



Study of Retinal Damage following Cyclosporine-A eating using Electroretinogram Technique

Samaneh Gholami (B.Sc.)¹, Agheel Tabarmolahanan (Ph.D.)^{2*}, Mohammad Masoud Shoushtarian (Ph.D.)³

1- Dept. of Biology, School of Basic Sciences, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.

2- Dept. of Immunology, School of Basic Sciences, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.

3- Ophthalmologist, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.

Received: 5 August 2017, Accepted: 14 October 2017

Abstract:

Introduction: Cyclosporine A is prescribed as an immunosuppressive agent in many diseases. One of the side effects of cyclosporine is visual disturbances and retinal damage. Different methods are available to investigate the damage to the retina, the best of which is the electroretinogram technique. In this study, the effects of cyclosporine on the retina of patients with rheumatoid arthritis were studied

Methods: In this observational study, which was a cross-sectional descriptive-analytic study, 55 patients with cyclosporine due to rheumatoid arthritis in 2012-2014 were randomly selected and subjected to electroretinography and voltage and delay phase were determined and compared with the normal range. The results were analyzed by means of statistical analysis of variance. Significant level was set at 0.05.

Results: The average recorded voltage in ERG was 74.7 with a standard deviation of 29.79, which showed a statistically significant difference from normal value of 125 ($P=0.0001$). The mean recorded latency was 33.9 with a standard deviation of 3.58, which means no significant difference from normal value of 32.39 ($P=0.545$).

Conclusion: Based on the results, it is concluded that the use of cyclosporine significantly reduces the voltage recorded in the electroretinogram, but does not affect the latency phase. Therefore, patients taking this medicine should continue their treatment according to the ophthalmologist.

Keywords: Electrotonography, cyclosporine, retina.

Conflict of Interest: No

*Corresponding author: A. Tabar Molahanan, Email: doctoragheel@yahoo.com

Citation: Gholami S, Tabarmolahanan A, Shoushtarian MM. Study of retinal damage following cyclosporine-a eating using electroretinogram technique. Journal of Knowledge & Health 2017;12(3):43-47.