



بررسی انتخاب نوع روش زایمان و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار شهرستان مراغه

اصغر محمدپوراصل^{۱*} (M.Sc.)، پروش اصغریان^۲، فاطمه رستمی^۳ (M.Sc.)، آرزو عزیزی^۴، حسین اکبری^۴

۱- دانشگاه علوم پزشکی تبریز- مربی اپیدمیولوژی. ۲- دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشجوی سال آخر کارشناسی پرستاری مراغه. ۳- مربی پرستاری کودکان دانشگاه آزاد واحد بناب- همکار تحقیقاتی مرکز کشوری برنامه مدیریت سلامت (NPMC). ۴- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی.

تاریخ دریافت: ، تاریخ پذیرش:

چکیده

مقدمه: در سال‌های گذشته میزان زایمان سزارین روند افزایشی داشته است. به دلیل عوارض جراحی، هزینه‌های مالی، دوره اقامت و بستری شدن مادر در بیمارستان، زایمان طبیعی ارجحیت دارد. با این حال در خواست و گرایش زنان به زایمان سزارین یکی از عوامل اساسی افزایش سزارین می‌باشد. هدف مطالعه حاضر، بررسی انتخاب نوع روش زایمان و دلیل آن و تعیین برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار شهرستان مراغه می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی ۲۵۰ زن در سه مرکز بهداشتی- درمانی شهرستان مراغه در شهریور ماه ۱۳۸۵ مورد مصاحبه قرار گرفتند. پرسش‌نامه این پژوهش شامل سؤالاتی برای کسب اطلاعات دموگرافیک، سابقه باروری، انتخاب نوع زایمان و دلیل انتخاب بود. داده‌ها با استفاده از آزمون مجذور کای و آزمون t مستقل در نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.

نتایج: از میان ۲۵۰ زن انتخاب شده ۱۷۹ مورد (۷۱/۶٪) زایمان طبیعی و ۷۱ مورد (۲۸/۴٪) زایمان سزارین را انتخاب نمودند. داشتن سابقه سزارین و محل مراجعه برای کنترل بارداری با انتخاب نوع زایمان ارتباط معناداری داشت ($P < 0/001$). علت انتخاب زایمان سزارین به ترتیب ترس از دردهای زایمانی، توصیه پزشک و تجربه سزارین قبلی بود.

نتیجه‌گیری: در صد انتخاب زایمان سزارین بالاست و برنامه‌های مداخله‌ای برای تغییر نگرش زنان نسبت به زایمان سزارین و افزایش آگاهی زنان در مورد زایمان بی‌درد برای کاهش شیوع زایمان سزارین لازم است.

واژه‌های کلیدی: روش زایمان، زایمان سزارین، زایمان طبیعی، مرکز بهداشتی- درمانی.

Original Article

Knowledge & Health 2009;4(1):

Investigating the Choice of Delivery Method Type and Its Related Factors in Pregnant Women in Maragheh

Asghar Mohammadpourasl^{1*}, Parivash Asgharian², Fatemeh Rostami³, Arezoo Azizi², Hossein Akbari⁴

1- Lecturer in Epidemiology, National Public Health Management Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. 2- Senior Student, Faculty of Nursing in Maragheh, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. 3- M.Sc. of Pediatric Nursing, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. 4- M.Sc. Student in Epidemiology, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

ABSTRACT:

Introduction: In recent years, there has been an increase in the trend for cesarean section. Due to surgical complications, financial costs and mother's long period of hospitalization, vaginal delivery is preferred as a favorite procedure. However, women's requests for and tendency toward cesarean is one of the main reasons for this increase. The aim of the present study was to study the choice of the delivery method type and its related factors in pregnant women in Maragheh.

Method: In this descriptive cross-sectional study, 250 pregnant women were interviewed in three primary health care centers in Maragheh in September, 2006. The questionnaire used in the study included items seeking demographic characteristics, fertility history, selection of the labor type and its reasons. Chi square and independent t-test were used to analyze the collected data through SPSS software.

Results: From 250 women who were selected for the study, 179(71.8%) selected the natural delivery and 71(28.4%) preferred cesarean section. Having a history of cesarean section and referral place for control of pregnancy were significantly associated with selection of the labor type ($P < 0.001$). The reasons for selection of cesarean section were fear of labor pain, physician recommendation and experience of recent cesarean.

Conclusion: The rate of selecting cesarean section is high. An intervention program aiming to change women's attitude toward cesarean section and to enhance their knowledge about painless delivery is required to reduce cesarean section prevalence.

Keyword: Method of Delivery, Natural Delivery, Cesarean section, Primary health care centre.

Received:

Accepted:

*Corresponding author: A. Mohammadpourasl, Email: poorasl@yahoo.com