



بررسی اثر بربرین بر عوامل اکسیداتیو سرم در مسمومیت مزمن با سرب

مرضیه پورابراهیمیان^۱، فاطمه زارع مهرجردی^{۲*}، مریم یادگاری^۳، آزاده شاهرخی رائینی^۳، منصور اسماعیلی دهچ^۴

- ۱- دانشجوی ارشد- گروه فیزیولوژی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوqi یزد- یزد- ایران.
- ۲- دانشیار- گروه فیزیولوژی- مرکز تحقیقات نورواندکریں یزد- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوqi یزد- یزد- ایران.
- ۳- استادیار- مرکز تحقیقات نورواندکریں یزد- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوqi یزد- یزد- ایران.
- ۴- ارشد فیزیولوژی- گروه فیزیولوژی- مرکز تحقیقات نورواندکریں یزد- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوqi یزد- یزد- ایران.
- ۵- دانشیار- گروه فیزیولوژی- مرکز تحقیقات نورواندکریں یزد- دانشکده پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوqi یزد- یزد- ایران.

تاریخ دریافت: ۱۳۹۹/۱۲/۹، تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۷/۱۲

چکیده

مقدمه: تماس مداوم با سرب حتی در مقادیر کم، می‌تواند منجر به آسیب در سیستم‌های مختلف بدن شود. تولید گونه‌های اکسیژن فعال (ROS) و تضعیف سیستم آنتی‌اکسیدانی درون‌زای، نقش عمده‌ای در صدمات ناشی از سرب دارند. عوامل دارویی با خاصیت آنتی‌اکسیدانی ممکن است در کاهش صدمات ناشی از سرب مؤثر باشند بنابراین در این مطالعه، اثر بربرین بر عوامل اکسیداتیو ناشی از سرب بررسی گردید.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه از ۴۰ موش نر نژاد ویستار استفاده شد. حیوانات به صورت تصادفی به ۵ گروه تقسیم شدند. ۱- گروه شم، ۴ گروه که به مدت دو ماه سرب از طریق خوراکی دریافت کردند. این ۴ گروه شامل گروه مسموم با سرب ppm۱۰۰ و ppm۵۰۰ و گروه مسموم با دوزهای ۱۰۰ و ۵۰ mg/kg قرار گرفتند، سرب به آب آشامیدنی حیوانات اضافه شد و بربرین روزانه گواز شد. بعد از طی دوره درمان، حیوانات به صورت عمیق بیهوش شدند. برای بررسی میزان فعالیت آنتی‌اکسیدان‌های گلوتاتیون (GSH)، کاتالاز (CAT) و سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و میزان مالون‌دی‌آلید (MDA) سرم، نمونه خون از قلب حیوانات گرفته شد.

نتایج: نتایج حاصل از بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی نشان داد که فعالیت CAT SOD و GSH سرم در گروه‌های مسموم با سرب تفاوت معنی‌داری با گروه شم ندارد. بربرین توانست فعالیت SOD را در گروه سرب ppm۵۰۰ افزایش دهد. بربرین در گروه مسموم با سرب که دوز ۵۰۰ سرب را دریافت کرده بودند، فعالیت CAT را نیز افزایش داد. همچنین، در گروه‌های سرب درمان شده با بربرین افزایش معنی‌داری در فعالیت GSH نسبت به گروه سرب مشاهده گردید. در بررسی میزان MDA مشاهده شد که میزان MDA سرم رت‌هایی که سرب دریافت کردن افزایش معنی‌داری نسبت به گروه شم پیدا کرده و بربرین در گروه سرب ۵۰۰ میزان MDA را کاهش داد.

نتیجه‌گیری: به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که در معرض قرار گرفتن با سرب به مدت ۲ ماه تأثیری بر فعالیت آنتی‌اکسیدان‌ها ندارد هر چند به صورت غیرمعنی‌داری فعالیت آنها را کاهش می‌دهد ولی میزان MDA سرم را افزایش می‌دهد. که این افزایش نشانه وجود استرس‌های اکسیداتیو است. همچنین در این مطالعه مشاهده شد که بربرین فعالیت آنتی‌اکسیدان‌ها را افزایش می‌دهد و میزان MDA را کم می‌کند.

واژه‌های کلیدی: سرب، بربرین، استرس‌های اکسیداتیو، سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز، گلوتاتیون.

*تویینده مسئول: یزد- میدان علم- بلوار شهیدی گمنام- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوqi یزد- دانشکده پزشکی- گروه فیزیولوژی- تلفن: ۰۳۵۳۸۲۰۳۴۱۲، نمبر: ۰۳۵۳۸۲۰۳۴۱۲.

Email: mehzarf@gmail.com

ارجاع: پورابراهیمیان مرضیه، زارع مهرجردی فاطمه، یادگاری مریم، شاهرخی رائینی آزاده، اسماعیلی دهچ منصور. بررسی اثر بربرین بر عوامل اکسیداتیو سرم در مسمومیت مزمن با سرب. مجله دانش و تدرستی در علوم پایه پزشکی ۱۴۰۰؛ ۱۶: ۲۷-۲۲.

شرایط نوری ۱۲ ساعت روشنایی و ۱۲ ساعت تاریکی و درجه حرارت ۲۲-۲۵ درجه سانتیگراد در قفسه‌های تمیز و شرایط یکسان، نگهداری شدند و دسترسی آزادانه به آب آشامیدنی و غذا داشتند. کلیه اصول اخلاقی مطابق با اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی مصوب در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوqi بزد انجام گرفت. پروژه حاضر با کد اخلاق: IR.SSU.MEDICINE.REC.1397.084 در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوqi بزد به تصویب رسید. حیوانات به صورت تصادفی به ۵ گروه تقسیم شدند: ۱- گروه شم ۲- گروه تحت مسمومیت با سرب ۱۰۰ ppm، ۳- گروه تحت مسمومیت با سرب +۱۰۰ ppm، ۴- گروه تحت مسمومیت با سرب ۵۰ mg/kg، ۵- گروه تحت مسمومیت با سرب +۵۰۰ ppm بربرین ۵۰ mg/kg انتخاب دوزهای ۵۰ mg/kg بربرین هیدروکلراید و استات سرب ۱۰۰ ppm و ۵۰۰ ppm بر اساس مطالعات گذشته انجام شد (۴ و ۸). با شروع آزمایش، استات سرب به مدت دو ماه همراه با آب آشامیدنی به موش‌ها داده شد و همزمان، بربرین هیدروکلراید نیز به صورت روزانه به موش‌ها گواز شد. محلول بربرین روزانه آماده می‌شد. سالین گرم به عنوان حلال برای بربرین هیدروکلراید استفاده شد. برای حل شدن بهتر بربرین در سالین گرم، محلول آماده شده به مدت چندین دقیقه به وسیله شیکر مخلوط گردید. در پایان دوره حیوانات با کتابخانه و زیالازین به طور داخل صفاقی و با دوز بالا بیهوش شدند. نمونه خون جهت بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی از قلب حیوانات گرفته شد. نمونه خون به مدت ۱۵ دقیقه در دور ۳۰۰۰ rpm سانتریفیوژ گردید و سرم آماده شده در دمای ۴۰-۸۰ نگهداری شد.

در نمونه سرمی حیوانات، سطح MDA به عنوان شاخصی از پراکسیداسیون لیپیدی و سطح فعالیت CAT، SOD و GSH به عنوان فاکتورهای آنتیاکسیداتیو مورد بررسی قرار گرفت. فعالیت آنتیاکسیدان‌ها و میزان MDA با استفاده از کیت شرکت زلیبو اندازه‌گیری شد.

برای بررسی فعالیت کاتالاز، ابتدا مقدار ۱۰ میکرولیتر از تمام نمونه‌ها به چاهک‌های میکرو پلیت اضافه شد. سپس ۱۰۰ میکرولیتر assay buffer و ۱۰ میکرولیتر H₂O₂ reagent اضافه و در دمای ۳۷ درجه به مدت یک دقیقه انکوبه گردید. سپس کروموزن و محلول رقیق گننده اضافه شد. در انتهای میکروپلیت‌ها در دستگاه الایزا ریدر قرار داده شد و جذب نوری در طول موج ۴۰۵ نانومتر قرائت گردید.

برای اندازه‌گیری SOD فعالیت این آنزیم همانند روش CAT نمونه سرمی به چاهک‌های الایزا ریدر اضافه شد و طبق پروتکل کیت بقیه مراحل انجام شد. سپس محلول‌ها، در زمان‌های صفر و دو دقیقه در طول موج ۴۲۰ نانومتر قرائت شد. آنزیم دیگری که بررسی شد

مقدمه


سرب یکی از این فلزات سنگین است که در همه جا یافت می‌شود. این فلز در بدن باقی‌مانده و تجمع می‌یابد و اثرات سمی خود را با اتصال به لیگاندھایی که برای اعمال فیزیولوژیک ضروری هستند اعمال می‌نماید (۱). دوزهای کم سرب در طولانی مدت و دوزهای زیاد در کوتاه مدت اثرات مخربی بر بخش‌های مختلف بدن اعمال می‌کنند (۲ و ۳). سرب باعث افزایش سطح رادیکال‌های آزاد اکسیژن (ROS) و افزایش رادیکال‌های OH و سوپراکسید می‌گردد. سرب علاوه بر افزایش میزان ROS، فعالیت آنتیاکسیدان‌های درون‌زا در بافت‌های مختلف را کاهش می‌دهد و از این طریق باعث آسیب‌های شدید اکسیداتیو در بافت‌های مختلف می‌گردد. با توجه به اینکه بسیاری از اثرات مضر سرب بر بدن ناشی از فعل شدن استرس‌های اکسیداتیو می‌باشد، استفاده از گیاهان و داروهایی که بر این فاکتورهای مضر اثر پیشگیری‌کننده یا درمانی داشته باشد، می‌تواند در کاهش عوارض ناشی از مسمومیت با سرب مفید باشد (۴).

تحقیقات دارویی بر روی ترکیبات شیمیایی عصاره گیاه بربرین نشان داد که این گیاه دارای آلkaloidهای ایزوکوئینولین شامل، بریامین، پالمتین و بربرین می‌باشد که بربرین از مهمترین آلkaloidهای طبیعی این خانواده می‌باشد. بربرین دارای اثرات متعدد از جمله اثرات ضدالتهابی، ضدیاباتی، آنتیاکسیدانی و آنتیآپوپتزری می‌باشد (۵ و ۶). مطالعاتی که بر روی عصاره و ریشه رزشک و عمدۀترین آلkaloid آن یعنی بربرین صورت گرفته است، خواصی مانند اثر آنتیاکسیدانی، ضدالتهاب و ضد درد، کاهنده فشارخون، هیپوگلیسیمی و پایین‌آورنده چربی، تنظیم کلسترول خون، بهبود عملکرد قلب و عروق، بهبود عملکرد کبد، تنظیم قند خون، کاهش وزن، ضد سرطان و ضد میکروب گزارش شده است. درمان با بربرین در موش‌های دیابتی که فشار خون و فعالیت نا منظم قلب داشتند باعث افزایش فعالیت SOD سرم شده است، در حالی که محتوای MDA را کاهش داده است (۷). بربرین بهدلیل داشتن خاصیت آنتیاکسیدانی و از طریق خنثی‌سازی رادیکال‌های آزاد در هیپوکمپ رت‌های دیابتیک نیز اثرات حفاظتی خود را بر این ناحیه اعمال کرده است و مانع از کاهش کاتالاز و سوپراکسیدیدیسماوتاز و سبب حفظ و بقا این آنزیم‌ها در هیپوکمپ گردیده است (۸).

با توجه به اثرات آنتیاکسیداتیو مؤثر بربرین، در این مطالعه اثر بربرین بر سطح آنتیاکسیدان‌ها و میزان MDA سرم، در رت‌های مسموم با سرب مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش‌ها

در این مطالعه تجربی از ۴۰ راس موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن ۲۵۰-۲۰۰ گرم استفاده شد. در طول دوره آزمایش، حیوانات در



نمودار ۱ - A: میزان فعالیت سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، B: فعالیت کاتالاز (CAT)، C: فعالیت گلوتاتیون (GSH) در گروههای مورد مطالعه (n=8). تجزیه و تحلیل آماری دادهها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) همراه با ppm آزمون توکی انجام شد. دادهها به صورت میانگین \pm SE بیان گردید. * ($P < 0.05$) و ** ($P < 0.01$) و *** ($P < 0.001$) تفاوت معنی دار با گروه شم، **** ($P < 0.0001$) تفاوت معنی دار با گروه Pb100M2 و ***** ($P < 0.00001$) تفاوت معنی دار با گروه Pb500M2: sham: Pb100M2: دریافت کننده سرب ۵۰۰ ppm به مدت دو ماه، Pb500M2: دریافت کننده سرب ۵۰۰ ppm به مدت دو ماه؛ BBR: بربرین.

نمودار B فعالیت کاتالاز سرم را نشان می دهد. در گروههای مسموم با سرب، فعالیت کاتالاز سرم کاهش داشت اما معنی دار نبود، تنها در گروه سرب ppm ۵۰۰ که بربرین دریافت کرده بود، فعالیت کاتالاز افزایش معنی داری نسبت به گروه سرب و گروه شم نشان داد. ($P \leq 0.01$)

گلوتاتیون بود. گلوتاتیون یک مولکول تریپتید است که از سه اسیدآمینه گلوتامات، سیستئین و گلایسین ساخته شده است. این مولکول در کنار مولکولهای دیگر سیستم آنتیاکسیدانتی سلول‌ها، یک مولکول حذف‌کننده پراکسید هیدروژن در نظر گرفته می‌شود. بررسی فعالیت گلوتاتیون طبق مراحل کیت شرکت زلیبو انجام شد. برای این منظور ۸۰ لاندا از نمونه‌ها در چاهک‌ها ریخته شد. سپس ۲۰ لاندا از محلول R2 به نمونه‌ها اضافه و برای ۱۰ دقیقه در دور ۴۰۰۰ سانتریفیوژ شد. پس از آن، محلول R3 به نمونه‌ها اضافه و به مدت ۵ دقیقه در دمای اطمی انکوبه شد. در انتهای میکروپلیت‌ها در دستگاه الایزا ریدر قرار داده شد و جذب نوری در طول موج ۴۱۲ نانومتر قرائت گردید.

برای بررسی MDA نیز از کیت شرکت زلیبو استفاده شد. اساس سنجش MDA اتصال TBA (تیوباریتوريک اسید) به آن و ایجاد ماده‌ی رنگی می‌باشد. روش کار به این صورت است که ابتدا تعداد ۸ محلول استاندار با غلظت معین تهیه گردید. ۵۰ میکرولیتر از محلول تیوباریتوريک اسید به نمونه‌ها و استانداردها اضافه شد. سپس یک میلی‌لیتر محلول کروموزن اضافه گردید. تمام ویال‌ها به مدت یک ساعت در دمای جوش قرار گرفت، سپس ۳۰ دقیقه در دمای صفر درجه انکوبه شد و پس از آن در دستگاه سانتریفیوژ صفر درجه، دور ۴۰۰۰ rpm به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفیوژ گردید. سپس محلول رویی میکروپلیت‌ها در طول موج ۵۳۵ نانومتر جذب نوری قرائت شد. غلظت مالون دی‌الدیئد، طبق نمودار استاندارد محاسبه گردید.

برای تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از این مطالعه، از نرم‌افزار graphpad prism 8 استفاده شد. مقایسه گروه‌ها با آنالیز واریانس یک طرفه انجام شد. جهت بررسی اختلاف بین گروه‌ها از پس آزمون توکی استفاده شد. سطح معنی داری آزمون ۵ درصد در نظر گرفته شد و داده‌ها به صورت mean \pm SE ارایه گردید.

نتایج


در این مطالعه فعالیت آنزیم‌های آنتیاکسیدان سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز و گلوتاتیون سرم رت‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نمودار A فعالیت SOD سرم حیوانات تحت مطالعه را نشان می‌دهد. تغییر معنی داری در فعالیت SOD در هر دو گروه سرب نسبت به گروه شم مشاهده نشد. بربرین فعالیت SOD سرم رت‌هایی که در معرض سرب ۵۰۰ ppm بودند را به طور معنی داری افزایش داد ($P \leq 0.01$) همچنین فعالیت SOD در این گروه نسبت به گروه شم نیز افزایش داشت ($P \leq 0.001$). بربرین تأثیری بر فعالیت SOD سرم در گروه سرب ۱۰۰ ppm نداشت (نمودار A).

می شوند (۹). قرار گرفتن در معرض مقدار متوسط تا زیادی از سرب از طریق ایجاد رادیکال‌های آزاد باعث افزایش استرس اکسیداتیو می‌شود (۴). عدم تعادل بین رادیکال‌های آزاد و سیستم دفاع اکسیدانی منجر به افزایش استرس‌های اکسیداتیو می‌گردد (۱۰-۱۲). که با افزایش پراکسیداسیون لیپیدها، پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلئیک (۱۲)، منجر به آسیب غسای سلولی، پروتئین‌های عملکردی و DNA می‌شود (۱۰). سیستم آنتی‌اکسیداتیو آندوژن یکی از سیستم‌های دفاعی بدن در مقابل آسیب‌های بافتی ناشی از گونه‌های اکسیژن واکنشی است و شامل آنزیم‌های سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز، گلوتاتیون، گلوتاتیون پراکسیداز می‌باشد (۱۳). سرب مستقیماً تأثیری بر تولید استرس‌های اکسیداتیو ندارد. اما قادر است به گروه‌ای سولفور آنزیم‌هایی که در زنجیره انتقال الکترون نقش دارند متصل گردد، همچنین باعث آزاد شدن Fe^{+2} و Cu^{+2} از این آنزیم‌ها گردد و عملکرد این آنزیم‌ها را مختلف کند. اختلال در این آنزیم‌ها باعث اختلال در زنجیره انتقال الکترون در میتوکندری‌ها و تولید رادیکال‌های آزاد اکسیژن می‌گردد. بنابراین سرب به طور غیرمستقیم استرس‌های اکسیداتیو را افزایش می‌دهد. افزایش رادیکال‌های آزاد اکسیژن در سلول منجر به آسیب اکسیداتیو آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی سلول می‌گردد. فعالیت کاتالاز می‌تواند مستقیماً توسط آنیون سوپراکسید (O_2^-) مهار شود، همچنین فعالیت سوپراکسید دیسموتاز به وسیله پراکسی نیتریت مهار می‌گردد. سرب مستقیماً با اتصال به گروه Sh گلوتاتیون، فعالیت این آنزیم را کاهش می‌دهد. افزایش استرس‌های اکسیداتیو همراه با کاهش فعالیت آنتی‌اکسیدان‌های آندوژن می‌تواند منجر به پراکسیداسیون لیپیدی غشاء، آسیب به اسیدهای نوکلئیک و پروتئین‌ها، تغییر در بیان ژن‌ها و فعل شدن فرآیندهایی گردد که منجر به آپو پتوز و نکروز سلولی می‌گردد (۴، ۱۴ و ۱۵). در مطالعه حاضر نیز سرب باعث افزایش پراکسیداسیون لیپیدی گردید. سرب از طریق تولید رادیکال‌های آزاد و در نتیجه افزایش پراکسیداسیون لیپیدی باعث اختلال در عملکرد دستگاه‌های مختلف بدن از جمله دستگاه قلبی عروقی می‌شود (۴).

در مطالعه حاضر همچنین مشاهده شد که بربرین، در هر دو گروه سرب، فعالیت آنتی‌اکسیدان‌های سرمی را افزایش و میزان پراکسیداسیون لیپیدی را کاهش می‌دهد همچنین طبق نتایج این مطالعه، بربرین توانست فعالیت آنتی‌اکسیدان‌های سرم رت‌های در معرض سرب را نسبت به گروه شم افزایش دهد. بربرین یک آکالولئید مشتق از ایزوکینولین جدا شده از Rhizoma coptidis است (۱۶). و اخیراً در درمان بسیاری از بیماری‌ها از جمله دیابت (۱۷ و ۱۸)، نقرس (۱۹)، سندروم متایولیک، بیماری کبد چرب، بیماری عروق کرونر قلب مورد استفاده قرار گرفته است و به طور گسترده‌ای اثرات محافظتی آن بر روی قلب گزارش شده است (۱۶). در بررسی مطالعات گذشته می‌توان مشاهده کرد که درمان با بربرین قبل از سکته قلبی، باعث

نمودار C فعالیت گلوتاتیون سرم را در حیوانات تحت مطالعه نشان می‌دهد. فعالیت گلوتاتیون در گروه‌های مسموم با سرب، تفاوت معنی‌داری با گروه شم نداشت. بربرین، فعالیت گلوتاتیون را هم در گروه مسموم با سرب 100 ppm ($P \leq 0.001$) و هم در گروه سرب 500 ppm ($P \leq 0.001$) افزایش داد. افزایش فعالیت گلوتاتیون در هر دو گروه سرب دریافت‌کننده بربرین نسبت به گروه شم نیز دیده شد ($P \leq 0.01$). ($P \leq 0.05$) (نمودار ۲).

نتایج بررسی میزان MDA سرم رت‌های مسموم با سرب نشان داد که میزان MDA سرم در هر دو دوز سرب 100 ppm ($P \leq 0.05$) و 500 ppm ($P \leq 0.05$)، نسبت به گروه شم افزایش معنی‌داری دارد. بربرین در گروه سرب 500 ppm میزان MDA را کاهش داد ($P \leq 0.05$) ولی تأثیری بر میزان MDA در رت‌هایی که سرب در یافته کرده بودند، نداشت (نمودار ۲).



نمودار ۲- میزان مالون دی‌آلدیید (MDA) سرم گروه‌های مورد مطالعه ($n=8$) تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) همراه با پس آزمون توکی انجام شد. داده‌ها به صورت میانگین \pm SE بیان گردید. * ($P < 0.05$) تفاوت معنی‌دار با گروه شم، # ($P < 0.05$) تفاوت معنی‌دار با گروه Sham. Pb100M2: دریافت‌کننده سرب 100 ppm به مدت دو ماه؛ شم، Pb500M2: دریافت‌کننده سرب 500 ppm به مدت دو ماه؛ BBR: بربرین.

بحث

در مطالعه حاضر سرب تأثیر معنی‌داری بر فعالیت آنتی‌اکسیدان‌های سرمی نداشت اما میزان MDA که شاخص پراکسیداسیون لیپیدی و نشانه وجود استرس‌های اکسیداتیو است را کاهش داد. سرب یکی از آلاینده‌های بسیار مهلك محیط زیست می‌باشد. که قدمت سمیت آن حداقل به قرن دوم قبل از میلاد برمی‌گردد (۹). مسمومیت با سرب در انسان، تمامی گروه‌های سنی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اثرات مخرب سرب به تدریج و در طولانی مدت ظاهر

8. Moghaddam HK, Baluchnejadmojarad T, Roghani M, Khaksari M, Norouzi P, Ahooie M, et al. Berberine ameliorate oxidative stress and astrogliosis in the hippocampus of STZ-induced diabetic rats. *Mol Neurobiol* 2014;49:820-6. doi: 10.1007/s12035-013-8559-7
9. Landrigan PJ. Lead and the heart: an ancient metal's contribution to modern disease. *The Lancet Public Health* 2018;3:e156-e7. doi: 10.1016/S2468-2667(18)30043-4
10. McLeay Y, Stannard S, Houltham S, Starck C. Dietary thiols in exercise: oxidative stress defence, exercise performance, and adaptation. *JISSN* 2017;14:1-8. doi: 10.1186/s12970-017-0168-9
11. Liu Q, Chen L, Hu L, Guo Y, Shen. Small molecules from natural sources, targeting signaling pathways in diabetes. *Biochim Biophys Acta Gene Regul Mech* 2010;1799:854-65. doi: 10.1016/j.bbarm.2010.06.004
12. Khani M, Motamedi P, Dehkholi MR, Nikukheslat SD, Karimi P. Effect of thyme extract supplementation on lipid peroxidation, antioxidant capacity, PGC-1α content and endurance exercise performance in rats. *JISSN*. 2017;14:1-8. doi: 10.1186/s12970-017-0167-x
13. Almani SA, Qureshi F, Shaikh TZ, Uqaili AA, Khoharo HK. Free radical scavenging activity of Berberine in acetaminophen induced liver injury. *Int J Surg Med* 2017;3:27-36.
14. Winiarska-Mieczan AJ. Protective effect of tea against lead and cadmium-induced oxidative stress—a review. *Biometals* 2018;31:909-26. doi: 10.1007/s10534-018-0153-z
15. Vaziri ND, Lin C-Y, Farmand F, Sindhu RK. Superoxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase and NADPH oxidase in lead-induced hypertension. *Kidney International* 2003;63:186-94. doi: 10.1046/j.1523-1755.2003.00711.x
16. Zhao G-l, Yu L-m, Gao W-l, Duan W-x, Jiang B, Liu X-d, et al. Berberine protects rat heart from ischemia/reperfusion injury via activating JAK2/STAT3 signaling and attenuating endoplasmic reticulum stress. *Acta Pharmacologica Sinica* 2016;37:347-367. doi: /10.1038/aps.2015.136
17. Li Z, Geng Y-N, Jiang J-D, Kong W-JJE-BC, Medicine A. Antioxidant and anti-inflammatory activities of berberine in the treatment of diabetes mellitus. *ECAM* 2014;2014:1-12. doi: 10.1155/2014/289264
18. Tian X, Liu F, Li Z, Lin Y, Liu H, Hu P, et al. Enhanced anti-diabetic effect of berberine combined with timosaponin B2 in Goto-Kakizaki rats, associated with increased variety and exposure of effective substances through intestinal absorption. *Front Pharmacol* 2019;10:19. doi: 10.3389/fphar.2019.00019
19. Wang H, Peng Y, Zhang T, Lan Q, Zhao H, Wang W, et al. Metabolic epoxidation is a critical step for the development of benzboradone-induced hepatotoxicity. *Drug Metab Dispos* 2017;45:1354-63. doi: 10.1124/dmd.117.077818
20. Zhou J-Y, Zhou S-W. Protective effect of berberine on antioxidant enzymes and positive transcription elongation factor b expression in diabetic rat liver. *Fitoterapia*. 2011;82:184-9. doi: 10.1016/j.fitote.2010.08.019
21. Farhadfar E, Behpour N, Azarbajjani M, Moradi A. The effect of endurance training and berberine chloride consumption on antioxidant enzymes in diabetic male Wistar rats heart tissue. *KAUMS Journal* 2020;23:627-36
22. Hasanein P, Riahi H. research p. Preventive use of berberine in inhibition of lead-induced renal injury in rats. *Environ Sci Pollut Res* 2018;25:4896-4903. doi: 10.1007/s11356-017-0702-y
23. Hasanein P, Ghafari-Vahed M, Khodadadi JJ. Effects of isoquinoline alkaloid berberine on lipid peroxidation, antioxidant defense system, and liver damage induced by lead acetate in rats. *Redox Report* 2017;22:42-50. doi: 10.1080/13510002.2016.1140406

کاهش اندازه سکته قلبی و بهبود عملکرد قلب می‌گردد و آسیب ناشی از آبپتوzu و استرس اکسیداتیو را کاهش می‌دهد. بربرین از طریق فعال کردن مسیر سیگنالینگ JAK2 / STAT3 و کاهش فشار ناشی از استرس، آسیب سکته قلبی را در رت‌ها، بهبودی بخشیده است (۱۶). در مطالعه‌ای که توسط زو و همکاران در سال ۲۰۱۱ بر روی موش‌های دیابتی انجام شد، بربرین بیان SOD کبدی و فعالیت CAT و SOD کلیه را به سطح طبیعی افزایش داد و همچنین با کاهش سطح MDA در کبد و مغز، وضعیت پراکسیداسیون لیپیدی را بهبود بخشید (۲۰). در مطالعه دیگری که روی موش‌های دیابتی انجام شد، فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان SOD، کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز در قلب رت‌های دیابتی به واسطه بربرین افزایش یافت (۲۱).

در دو مطالعه دیگر اثر بربرین بر نفووتوكسیسیتی و هپاتوتوكسیسیتی ناشی از مسمومیت مزنن با سرب مورد بررسی قرار گرفت. در کلیه رت‌های مسموم با سرب، بربرین، طرفیت آنتی‌اکسیدانی کلیه را افزایش داد و باعث کاهش استرس‌های اکسیداتیو و بهبودی مارکرهای بیوشیمیابی عملکرد کلیه و کاهش آسیب بافت کلیه گردید (۲۲). در بررسی کبد رت‌های مسموم با سرب نیز درمان با بربرین، از طریق تقویت مکانیسم‌های دفاعی آنتی‌اکسیدان، از عدم تعادل پروکسیدان و هپاتوتوكسیسیتی ناشی از سرب و پراکسیداسیون لیپیدی جلوگیری کرد و نتایج این مطالعات کاملاً مطابق با نتایج مطالعه حاضر بود که بربرین باعث بهبود فعالیت کاتالاز، SOD و گلوتاتیون در سرم رت‌های مسموم با سرب گردید و میزان پراکسیداسیون لیپیدی را کاهش داد.

تشکر و قدردانی

این مقاله حاصل از قسمتی از رساله کارشناسی ارشد فیزیولوژی در گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد می‌باشد.

References

1. Wani AL, Ara A, Usmani JA. Lead toxicity: a review. *Interdiscip Toxicol* 2015;8:55-64. doi: 10.1515/intox-2015-0009
2. Juberg DR, Kleiman CF, Kwon SC. Position paper of the American Council on Science and Health: lead and human health. *Ecotoxicol Environ*. 1997;38:162-80. doi: 10.1006/ecsa.1997.1591
3. Needleman HL. The future challenge of lead toxicity. *Environ Health Perspect* 1990;89:85-9.
4. Patrick L. Lead toxicity part II: the role of free radical damage and the use of antioxidants in the pathology and treatment of lead toxicity. *Alternative medicine review*. 2006;11:114-127.
5. Imenshahidi M, Hosseinzadeh H. Berberine and barberry (*Berberis vulgaris*): A clinical review. *Phytotherapy Research* 2019;33:504-23. doi: 10.1002/ptr.6252
6. Cai Z, Wang C, Yang W. Role of berberine in Alzheimer's disease. *Neuropsychiatr Dis Treat* 2016;12:2509. doi: 10.2147/NDT.S114846
7. Singh IP, Mahajan S. Berberine and its derivatives: a patent review (2009–2012). *Expert Opin Ther Pat* 2013;23:215-31. doi: 10.1517/13543776.2013.746314



Evaluation of the Effect of Berberine on Serum Oxidative Agents in Chronic Lead Poisoning

Marzieh Pour-Ebrahimian (M.Sc. Student)¹, Fatemeh Zare Mehrjerdi (Ph.D.)^{2*}, Maryam Yadegari (Ph.D.)², Azadeh Shahrokhi Raeini (M.Sc.)², Mansour Esmaili Dehaj (Ph.D.)²

1- Dept. of Physiology, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services, Yazd, Iran.

2- Dept. of Physiology, Yazd Neuroendocrine Research Center, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences and Health Services, Yazd, Iran.

Received: 27 February 2021, Accepted: 4 October 2021

Abstract:

Introduction: Constant exposure to lead, even in small amounts, can lead to damage to various systems of the body. The production of reactive oxygen species (ROS) and the weakening of the endogenous antioxidant system play a major role in lead damage. Antioxidant drugs may be effective in reducing lead-induced damage, so in this study, the effect of berberine on lead-induced oxidative agents was investigated.

Methods: In this study were used forty male wistar rats. The animals were randomly divided into 5 groups. 1- Sham group, four groups that received lead orally for one month. These four groups included the 100ppm and 500ppm lead poisoned groups and the 100 and 500ppm lead poisoned groups treated with berberine 50mg / kg. Lead was added to the drinking water of the animals and berberine was gavaged daily. After the treatment period, the animals were deeply anesthetized and blood sample was taken from the heart of animals to evaluate the activity of antioxidants glutathione (GSH), catalase (CAT) and Superoxide Dismutase (SOD) and malondialdehyde MDA level in the serum.

Results: The results of biochemical factors showed that serum SOD, CAT and GSH activity in lead poisoning groups were not significantly different from sham group. Berberine was able to increase SOD activity in the lead 500 group. Berberine also increased CAT activity in the lead-poisoned group receiving 500 dose of lead. Also, in lead groups treated with berberine, a significant increase in GSH activity was observed compared to the lead group. The results of the MDA examination showed that the serum MDA level of rats that received lead increased significantly compared to sham group and berberine decreased MDA level in lead 500 group.

Conclusion: In general, the results of this study showed that exposure to lead for 2 months has no effect on the activity of antioxidant, but increases serum MDA. Increased MDA indicates the presence of oxidative stress. The study also found that berberine increased the antioxidants activity and decreased the MDA level.

Keywords: Lead, Berberine, Oxidative stress, Superoxide dismutase, Catalase, Glutathione.

Conflict of Interest: No

*Corresponding author: F. Zare Mehrjerdi, Email: mehzarf@gmail.com

Citation: Pour-Ebrahimian M, Zare Mehrjerdi F, Yadegari M, Shahrokhi Raeini A, Esmaili Dehaj M. Evaluation of the effect of berberine on serum oxidative agents in chronic lead poisoning. Journal of Knowledge & Health in Basic Medical Sciences 2021;16(3):22-27.